



INFECCIONS PVH

NO GENITALS



BERRUGUES

- ★ Afecten 7-10 % població de 9 a 15 a.
- ★ Vulgars
- ★ Plantars
- ★ Filiformes
- ★ Plantars en mosaic

Cuadro I. – PVH cutáneos y asociados a la epidermodisplasia verruciforme (según⁴³).

PVH cutáneos	
verruga plantar profunda	1
verrugas vulgares	2, 4, 29, 75*, 76*, 77*
verrugas planas	3, 10, 28
verrugas intermedias	10, 26**, 27**, 28, 29
verrugas de los carniceros	7
enfermedad de Bowen	34
queratosis actínicas	36
queratoacantoma (un solo caso)	37
melanoma (un caso)	38
carcinoma espinocelular	41, 48*
lesiones precancerosas	49
papiloma maxilar invertido	57
quiste epidermoide plantar	60
verruga plantar profunda quística	63
verrugas pigmentadas	65

PVH específicos de la epidermodisplasia verruciforme	
lesiones benignas	5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 36, 46, 47, 49, 59
lesiones cancerosas	5, 8, 20, 47

PVH: papilomavirus humano; *: en pacientes inmunodeprimidos; **: sobre todo en pacientes inmunodeprimidos.



Berruga vulgar



- ★ PVH 2-4
- ★ Tumor epidèrmic, papilomatós i queratòsic
- ★ 1 o més mm.
- ★ Dits de les mans i mans
- ★ Koebner





BERRUGA VULGAR





BERRUGA PLANA



- ★ PVH 3,10,28
- ★ Pàpules llises de 3-4 mm.
- ★ Color rosa pàlid
- ★ Cara, avantbraços, mans





BERRUGUES





BERRUGUES PLANTARS



★ T.endofítics,
dolorosos

★ Punts de suport

★ PVH 1





BERRUGES MOSAIC



- ★ Més superficials i extenses.

- ★ Indolores



- ★ Lleuger relleu

- ★ PVH 2





Berrugues



★ Berrugues filiformes

★ PVH 2

★ Cara i coll



★ Berrugues plantars
amb conservació de
dermatoglifos

★ Quiste epidermoide
plantar

★ PVH 60





EVOLUCIÓ



★ 2/3 regressió espontània als 2 a.

★ Les b. Planes amb signes d'inflamació

★ Les b. Vulgars i plantars ,enfosquiment





TRACTAMENT





EPIDERMODISPLÀSIA BERRUCIFORME



★ Malaltia genètica

★ Susceptibilitat anormal a determinats PVH

★ Oncògens PVH 5,8,47



★ Baix potencial oncogen PVH 14,20,21,25

★ Transmissió autosòmica recessiva,
dominant, lligada a crom. X





EPIDERMODISPLÀSIA BERRUCIFORME



★ Apareix entre els 4-8 a. Tota la vida

★ Localitza a pell



★ B. Planes escampades a mans, EEII i cara

★ A tòrax. Màcules escatoses despigmentades o marronoses.



★ Evolucio a 20 a. zones fotoexposades, com queratosis actínica, m. Bowen..Carcinoma



EPIDERMODISPLÀSIA BERRUCIFORME



★ Dèficit específic de la Immunitat cel·lular amb disminució de la citotoxicitat Natural Killer i de la proliferació dels limfos T



★ Dèficit de la Immunitat cel·lular no específica amb anèrgia cutània als sensibilitzants.



★ UV B

★ Protecció del sol i dels Rx



E.B.





E.B.

