

Molluscum contagiosum

- Dr. Josep Boronat Hidalgo
Dispensari I.T.S.
Tarragona

Molluscum contagiosum





- Poxvirus. ADN
- Ortopoxvirus. Varola
- Parapoxvirus. Orf

Molluscum contagiosum

- Infecta humans, ximpanzés, cangurs...
- Distribució universal
- Contagi per contacte directe
- Rar abans de l'any de vida

càlids

- Pic màxim entre 1 i 4 anys
- Contagis múltiples dins de la família

freds

- Pic màxim 10-12 a.
- No freqüents contagis intrafamiliars
- Relació amb piscines

Patogènia

- Infecta queratinocits basals
- Augment del recanvi cel.lular suprabaasal
- Augment síntesi ADN víric fins estrat espinós de l'epidermis

Clínica.

- P. Incubació. De 14 dies a 6 mesos
- Pàpula umbilicada brillant, blanc perlada, a vegades amb un poro central
- De 1mm. a 10 mm.
- Poques o en plaques



Clínica ..

- Més comú en presència ecz. Atòpic
- Immuno deprimids
- Sarcoidosi



Molluscum c. genitals



Molluscum sexual



Molluscum adults



Clínica...

- Durada de la lesió individual i del brot entre 6 i 9 mesos
- Lesions individuals 2 mesos (5 a)
- Clorur d'etil.Umbilicació

Tractament

- Mecànic: pinces ,legra(EMLA)
- Crioteràpia
- Cimetidina oral.
- Cinta adhesiva
- Àcid retinoic tòpic